



# HYPPOLAC

VOOR DE VERVANGING VAN MOEDERMELK

## 1. AANBEVOLEN GEBRUIK

Cavalor® Hyppolac is een licht verteerbare oplosmelk met gelijkaardige nutritionele waarden als natuurlijke merriemelk. Gedurende de eerste levensweken is het veulen volledig afhankelijk van de melk die het drinkt bij de merrie. Voldoende voedzame melk is essentieel voor een gelijkmatige groei en goede ontwikkeling. Cavalor Hyppolac is een volwaardige oplosmelk voor moederloze veulens of veulens die onvoldoende kwalitatieve melk kunnen drinken bij de merrie.

## 2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN

Cavalor® Hyppolac bevat hoogwaardige mineralen en vitamines die goed opgenomen worden. De energierijke melkvervanger bevat naast vitamines A, D3, E, ook calcium, koper, ijzer, mangaan, zink, selenium, lysine, methionine en andere essentiële aminozuren om te voldoen aan de behoeften van veulens.

RUW EIWIT → 23,00%	MANGAAN → 50,00 mg/kg	
VITAMINE A → 25 000 IU/kg	SELENIUM → 0,25 mg/kg	CALCIUM → 1,00%
VITAMINE E → 100 mg/kg	RUW VET → 15,50%	IJZER → 80,00 mg/kg
KOPER → 3,00 mg/kg	VITAMINE D3 → 4000 IU/kg	ZINK → 55,00 mg/kg

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN

## 3. GEBRUIKSAANWIJZING

Verstrek Cavalor® Hyppolac met een fles met speen of via een emmer. De ideale concentratie is 135 g Cavalor® Hyppolac per l water. De hoeveelheid melk per maaltijd en het aantal maaltijden is terug te vinden in onderstaand schema.

Los de benodigde hoeveelheid Cavalor® Hyppolac in de halve hoeveelheid water op bij een temperatuur van 60 °C. Roer het poeder goed tot het geheel opgelost is. Leng het geheel vervolgens aan met lauw water tot het mengsel de gewenste temperatuur van 40 °C heeft.

Bij optreden van diarree, kan de dosering aangepast worden naar 65 g Cavalor® Hyppolac per l water. Wanneer de diarree vermindert kan de concentratie opgedreven worden naar de normale aanbevolen concentratie. Raadpleeg bij diarree steeds een dierenarts.

Opgelet: Cavalor® Hyppolac dient altijd opgelost te worden in water. Los op het voeder strooien kan slokdarmobstructies veroorzaken.

## FOKKERIJ

Age in weeks / Leeftijd in weken / Age en semaines / Alter in wochen:	Number of meals a day / Aantal maaltijden per dag / Nombre de repas par jour / Portionen pro Tag:	Quantity per day / Hoeveelheid per dag / Quantité par jour / Quantität pro Tag:	Quantity per meal / Hoeveelheid per maaltijd / Quantité par repas / Quantität pro Portion:
1	≥ 12	≥ 3,5 L	± 300 ml
2	≥ 10	≥ 4,5 L	± 450 ml
3	≥ 7	≥ 4,5 L	± 650 ml
4-5	≥ 5	≥ 5 L	± 1000 ml
6-12	≥ 2	≥ 5 L	± 2500 ml
13-14	≥ 2	≥ 4 L	± 2000 ml
15-16	≥ 1	≥ 4 L	± 4000 ml

## 4. VERPAKKING EN BEWARING

#/OVERDOOS	EANCODE	VERPAKKING
1	 5425016900406	Cavalor® Hyppolac 10 kg - 22 lb

