



COLOSTRA

DLA ZDROWIA NOWONARODZONEGO ŻREBAKA

1. ZALECANE STOSOWANIE

Cavalor® Colostra dostarcza niezbędną siarę dla nowonarodzonych źrebiąt, gdy klacz nie może jej dostarczyć lub w niewystarczającej ilości.

Nowonarodzone źrebaki rodzą się bez przeciwciał i muszą je wchłonąć przez siarę w ciągu 24 godzin od urodzenia. Jeśli źrebię otrzymało niewiele lub nie otrzymało wcale siary z jakiegokolwiek powodu, konieczne jest wyrównanie tego niedoboru. Cavalor Colostra podnosi poziom immunoglobulin we krwi. Pomaga to wzmocnić obronę źrebaka przed patogenami, takimi jak wirusy i bakterie, w pierwszym tygodniu życia. Solidny start jest niezbędny dla zdrowego wzrostu i rozwoju źrebaka.

2. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU - KLUCZOWE SKŁADNIKI

U ssaków, w tym koni, zarodki nie otrzymują (prawie) żadnych przeciwciał przez łożysko w macicy. Oznacza to, że aby uzyskać odporność, źrebięta są całkowicie zależne od przeciwciał, które otrzymują z wysokiej jakości siary w ciągu pierwszych kilku godzin po urodzeniu. Wchłanianie przeciwciał z siary jest największe w ciągu pierwszych 6 do 8 godzin po urodzeniu. 24 godziny po urodzeniu źrebię nie będzie już w stanie wchłonąć przeciwciał przez siarę.

Niedobór immunoglobulin występuje u źrebiąt osieroconych, ale także u źrebiąt klaczy z niskim poziomem siary, jej brakiem lub niedostatecznej jakości. Zbyt mała liczba immunoglobulin zwiększa ryzyko rozwoju chorób zakaźnych u źrebaka, takich jak biegunka lub inne dolegliwości.

Cavalor Colostra zawiera naturalne substancje (лиофилизованą siarę), które są niezbędne dla zdrowego wzrostu źrebiąt. Cavalor Colostra jest bezpieczny dla wszystkich źrebiąt i zawiera co najmniej 30% immunoglobulin.

3. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wymieszaj zawartość 1 opakowania (100 g) Cavalor® Colostra z 0,2 l Cavalor® Hyppolac lub wodą. Dobrze wymieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Do podania Cavalor® Colostra użyj butelki ze smoczkiem.

Uwaga: nie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ spowoduje to zniszczenie immunoglobulin

Jeśli źrebak nie otrzymał od klaczy siary: Podać Cavalor® Colostra w ciągu 6 godzin po urodzeniu i powtórzyć po 12-16 godzinach.

Jeśli źrebak otrzymał od klaczy za mało siary: Podać Cavalor® Colostra w ciągu 24 godzin po urodzeniu.



Cavalor® Colostra można również podawać profilaktycznie w ciągu pierwszych 24 godzin, aby zapewnić źrebakowi wystarczającą ilość przeciwciał.

4. PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

#/OUTER BOX	EANCODE	PACKAGING
1	 5425016900277	Cavalor® Colostra 100 g – 0,22 lb